

Remdesivir



读音为‘瑞姆-德-司韦’

Remdesivir 是一种抗病毒药物，适用于感染 COVID-19 病毒的某些患者，可以帮助患者迅速康复和免于接受住院治疗。

Remdesivir 只有在 COVID-19 发病后 7 天内使用时有效。您的医疗团队将决定您是否需要使用此药物。

Remdesivir 通过缓慢输注给药



Remdesivir 每天给药一次，通常持续使用 3 天。



通过静脉给药（称为静脉输注），在 30 至 120 分钟内输注。



您通常可以在当地医院或当地医疗中心接受静脉输注。

输注期间的监测

某些人可能会对 remdesivir 产生反应，所以在输注期间和输注后短期内需要受到仔细监测。

如果您出现以下任何症状，请告知您的医生或护士：

- 出汗或发抖
- 恶心、呕吐
- 起立时眩晕
- 皮疹、喘鸣或气短
- 面部、喉咙、舌头、嘴唇或眼部肿胀。

您的医生或护士可能需要减慢输注速度或停止治疗。

所有药物都有一些副作用

Remdesivir 会引起副作用，尽管不是每个人都会出现副作用。

常见的副作用

这些副作用通常比较轻微，会随时间或在停药后消失。

如果这些副作用对您造成影响或不消失，请告知您的医生：

- 感觉不适（恶心）
- 头痛
- 皮疹。

罕见、严重的副作用

如果您出现过敏反应体征，例如严重皮疹、浮肿或眼睑或眼周围、面部、嘴唇或舌头肿胀，请致电 111 请求救护车服务。

如果您出现任何肝脏问题体征，例如眼球或皮肤变黄、尿色变深或上腹部疼痛或不适，请与您的医疗团队或 Healthline 联系，电话是 0800 611 116。

告诉他们您正在服用 remdesivir。



欲详细了解 remdesivir，请访问以下网站：
hn.org.nz/remdesivir